

Okruhlica L., Klemková D., Bajcárová L.: **Depresie a skóre BECKovho dotazníka u pacientov so závislosťou od opioidov.** Alkoholizmus a drogové závislosti, 2002, roč. 37, č 4 - 5, s. 209 – 218.

### **Súhrn**

Známy je vysoký výskyt depresívnych symptómov u pacientov vstupujúcich do liečby kvôli závislosti od opioidov. Zložité je ale rozlíšenie medzi depresívnymi symptómami viazanými na užívanie opiátov (vzťahujúcimi sa k látke) a symptómami oddelenej samostatnej poruchy nálady, ktorá môže byť súčasťou dvojitej diagnózy. Beckov dotazník depresivity (BDI) bol administrovaný pacientom so závislosťou od heroínu (n = 809) v čase ich prijímania do liečby. Priemerné skóre v BDI bolo 23 bodov a pri aplikácii pôvodného cut-off sa 41% výsledkov nachádzalo v pásme silnej depresie. Napriek tomu z tých, ktorí boli ďalej sledovaní v rámci programu lôžkovej liečby (n = 91), iba 11% vyžadovalo farmakoterapiu antidepresívami. Ako identických s objektívnymi symptómami syndrómu odňatia opiátov sme identifikovali viac ako polovicu položiek BDI. Diskrepancia medzi vysokým priemerným skóre BDI na začiatku liečby a pomerne malým počtom diagnóz depresívnej poruchy nálad je diskutovaná a videná ako možný dôsledok čiastočného prekryvania sa dvoch syndrómových entít v ich symptomatických vyjadreniach: syndrómu odňatia opiátov a depresívneho syndrómu. V práci je prezentovaná podrobnejšia analýza zistení.

**Kľúčové slová:** závislosť od opiátov - depresia - BDI - antidepresíva.

### **Summary**

The high prevalence of depressive symptoms is known among entries to treatment for opioid dependence. But distinction is difficult between opiate-related depressive symptoms (substance related) and symptoms of separate mood disorder, which can be part of double diagnosis. Beck depression Inventory (BDI) was administered to patients with heroin dependence (n=809) at the time of intake to treatment. Their average BDI score was 23 and using original cut-off 41% of the results were in the range of severe depression. However, of those who were followed-up in further in patient treatment program (n = 91), only 11 % required pharmacotherapy with antidepressants. We have identified more than half of BDI items as been identical with subjective and objective symptoms of opiate withdrawal syndrome. So this discrepancy between high average of BDI score at the beginning of treatment, and relatively small proportion of number of diagnosis of depressive mood disorder is discussed and viewed as possible consequence of partial overlapping of two syndrome entities in their symptom expressions: syndrome of opiate withdrawal and depressive syndrome. More detailed analysis of findings is presented. Further research is needed in this direction.

**Key words:** dependence on opiates - depression - BDI - antidepressant.