

Okruhlica L.: **Praktický význam reverzibility syndrómu závislosti od psychoaktívnych látok.** Alkoholizmus a drogové závislosti, 2001, roč. 36, č. 4 - 5, s. 205 - 210.

Súhrn

Práca zdôrazňuje základné zásady pri stanovaní diagnózy syndrómu závislosti v najpoužívanejších diagnostických klasifikáciách: DSM-IV a MKCH-10 so zameraním na zmeny klinického obrazu obrazu poruchy v čase. Nezaoberá sa tým, aké sú kritériá určovania diagnózy u pacienta po prvý raz v jeho živote, ale tým, aké sú kritériá na potvrdenie, alebo eliminovanie diagnózy syndrómu závislosti a činitele modifikujúce priebeh u pacienta, ktorý už mal diagnózu v minulosti medicínsky stanovenú. Uvedené sú dôležité klinické, zdravotnícko - organizačné, etické, sociálne a právne dôsledky existencie možnosti reverzibility diagnózy závislosti od psychoaktívnych látok.

Kľúčové slová: diagnóza - syndróm závislosti - priebeh - reverzibilita - MKCH-10 - DSM-IV.

Summary

Paper underlines basic diagnostic rules, which are used in a assessment of the diagnosis of dependence syndrome in the most frequently used diagnostic classifications: DSM-IV and ICD-10 with focus on changes in clinical picture in the course of time. The diagnostic criteria at the time of the patient in his life are not the main issue here, but these are criteria to confirm or to eliminate the diagnosis of dependence syndrome and the course modifiers in the patient, who has already been given medical diagnosis in the past. Important clinical, health organizational, ethical, social and legal implications of the existence of the possibility to reverse the diagnosis of dependence syndrome on psychoactive substances are mentioned.

Key words: diagnosis - dependence syndrome - course - reversibility - ICD-10 - DSM-IV.