

Valková I., Okruhlica O.: **Môže byť slušný človek zároveň alkoholikom?** Alkoholizmus a drogové závislosti, 2009, roč. 44, č. 2, s. 67 – 82.

Súhrn

Podnetom pre náš výskum bola spoločensky zakorenená predstava, že osoba so závislosťou od alkoholu sa automaticky vyznačuje prvkami antisociálneho správania, čo vedie k predsudkom a jednotlivcov stigmatizuje. *Cieľom* štúdie bolo preskúmať, či sú klinické doklady toho, že existujú aj ľudia so závislosťou od alkoholu bez prejavov antisociálneho správania, a to počas niektorého obdobia alebo aj v priebehu celého ochorenia. *Pacienti a metodika:* Vo vzorke 128 aktuálne liečených pacientov pre závislosť od alkoholu v CPLDZ Bratislava (70,3% mužov, 29,7% žien; priemerný vek 45 (SD±11,5 rokov) sme vykonali kvantitatívnu analýzu relevantných položiek dotazníka VAST a tiež obsahovú analýzu zdravotnej dokumentácie a vybraných kazuistík pacientov. *Výsledky:* 21,9% pacientov nevykazovalo žiadne nami sledované prejavy antisociálneho správania nikdy vo svojom živote a v období intenzívneho rozvoja závislosti do 5 rokov pred vstupom do liečby sme ich nezistili až u 32,0%. V dávnejšom období, to je v mladšom období rozvoja závislosti, nevykazovalo antisociálne prejavy až 57,8% z nich. *Záver:* Oba nami použité metodologické prístupy podporili naše hypotézy. Bezpodmienečné spájanie závislosti od alkoholu s antisociálnym správaním sa javí byť bez vedeckého podkladu a je odborne neprijateľné.

Kľúčové slová: závislosť od alkoholu – antisociálne správanie – labelling

Valková I., Okruhlica E.: **Is there a possibility to be a squared and an alcoholic at the same time?** Alkoholizmus a drogové závislosti, 2009, roč. 44, č. 2, s. 67 – 82.

Summary

Our research was stimulated by the existence of common assumption in the society, that person with alcohol dependency is automatically characterized as having the elements of the antisocial behaviour, which leads to the prejudices and stigmatizes the individuals. *Aim* of the study was to find out, if there is any clinical evidence for the existence of the people with alcohol dependency syndrome without signs of the antisocial behaviour, during some stages, or during the whole course of the disease. *Patients and Methods:* We have conducted the quantitative analysis using VAST questionnaire, as well as content analysis of the selected case histories, in the sample of 128 patients (70.3% males, 29.7% females; average age 45 (SD±11.5) from CPLDZ Bratislava. *Results:* 21.9% of the patients did not reveal any of the signs of the antisocial behaviour, which were studied by us during the whole life. We did not find them among 32.0% of the patients in the period of the last five years of active dependence, which were preceding current treatment. The signs of antisocial behaviour were not manifested by 57.8% of them during their more distant past. *Conclusions:* Our hypotheses have been supported by both methodological approaches we have used. Unconditional association of dependence on alcohol with the antisocial behaviour seems to be not based on the scientific evidence and so is professionally unacceptable.

Key words: alcohol dependency – asocial behaviour – labelling