

Slezáková S., Okruhlica L.: **Motivácia na liečbu hepatitídy C u užívateľov psychoaktívnych látok.** Adiktologie, 2011, roč. 11, č. 3, s. 142 – 146.

*Východiská:* Infekcia vírusom hepatitídy typu C (HCV) medzi injekčnými užívateľmi psychoaktívnych látok má vysokú prevalenciu. Mnohí z nich nevstupujú do liečby interferónom, napriek tomu že liečba je dostupná. Cieľom štúdie bolo zistiť medzi pacientmi liečenými pre závislosť od psychoaktívnych látok, prečo nevstúpili do liečby infekcie HCV. *Metódy:* vzorku tvorilo 482 pacientov z Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave s priemerným vekom 32 rokov ( $SD \pm 6,3$ ), v rozpätí od 18 do 59 rokov. Z nich bolo 323 mužov (67 %). Do štúdie boli zapojení pacienti, ktorí mali reaktívne protilátky v krvi na hepatitídu typu C. Pacienti vyplnili krátky dotazník. *Výsledky:* 84 % pacientov vedelo o svojom výsledku pozitívnom na protilátky anti-HCV. Vedomosť mali v priemere 3,5 roka ( $SD \pm 40$ ), v rozmedzí od 1 mesiaca po 17 rokov. 95 % pacientov vedelo o možnostiach liečby vírusu HCV. 25 % pacientov sa na vírus HCV liečilo. Pri zisťovaní, prečo sa ostatní neliečia, sme zistili, že 45 % nespĺňalo kritéria pre zaradenie do liečby, 22 % malo nedostatok záujmu/motivácie na vstup do liečby, 6 % malo strach z vyžadovanej biopsie pečene a 27 % uviedlo rôzne iné dôvody. *Závery:* Existujú rôzne dôvody prečo užívatelia psychoaktívnych látok nevstupujú do liečby infekcie hepatitídy typu C. Nedostatok informácií je len malou časťou z nich. Významným faktorom sa javí byť nedostatočná motivácia počas asymptomatického obdobia. Naše zistenia poukazujú na dôležitosť motivačného poradenstva pri rešpektovaní autonómie v rozhodovaní u pacienta.

**Kľúčové slová:** hepatitída C – liečba – motivácia – injekční užívatelia psychoaktívnych látok.

Slezáková S., Okruhlica L.: **Motivation for treatment of HCV infection among drug users.** Adiktologie, 2011, roč. 11, č. 3, s. 142 – 146.

*Background:* Hepatitis C infection is prevalent among injecting drug users. Many of them do not start treatment, even if it is accessible and affordable. *Aims:* The objective of the study was to find out which are the most frequently presented reasons for not entering treatment of HCV by infected drug users. *Design and Measurements:* Sample consisted of 482 HCV-positive patients with average age 32 years ( $SD \pm 6.3$ ), in the range from 18 to 59 years, who were treated in the Centre for Treatment of Drug Dependencies in Bratislava. Among them were 323 males (67 %). The patients had to fill in a short questionnaire. *Results:* 84 % of them were aware of their HCV serostatus. They knew about it on an average already for 3.5 years ( $SD \pm 40$ ), in the range from 1 month to 17 years. 95 % of the patients were informed about the HCV treatment options. Out of them 25 % has been treated for HCV. The reasons for not being in treatment were: 45 % not fulfilling the inclusion criteria for HCV treatment; 22 % had not enough interest/motivation entering treatment, 6 % was afraid of required liver

biopsy and 27 % mentioned various other reasons. *Conclusions:* Various reasons exist, why the patients with HCV infection do not enter the treatment for it. The lack of information is only a small part. Non-sufficient motivation seems to be an important factor during the asymptomatic period of HCV infection. Our findings indicate the importance of ethically conducted motivation enhancement counselling with respect to the patient's autonomy during decision making process in the same time.

**Key words:** hepatitis C – treatment – motivation – injecting drug users.